

# ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤 キューピーコーワ コンドロイザー $\alpha$

キューピーコーワコンドロイザー $\alpha$ は関節・神経の働きに効果のあるビタミンB<sub>1</sub>をはじめとした有効成分に、鎮痛・抗炎症作用のある生薬ボウイ、関節軟骨の構成成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合し「今ある痛み」に働きかけ、ツライひざなどの関節痛・神経痛に効果をあらわしていきます。

## 製品特長

- 鎮痛・抗炎症作用のある生薬ボウイを配合し、痛みや炎症を抑え、ツライひざなどの関節痛・神経痛などを緩和します。
- キズついた末梢神経に働きかける活性型ビタミンB<sub>12</sub>(メコバラミン)を配合しています。
- 食前・食後にかかわらず、1日2回の服用で効果を発揮します。
- のみやすいフィルムコーティング設計の錠剤です。

## コンドロイザー $\alpha$ の作用メカニズム



## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
軟便、下痢
- ④ 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

1. 次の諸症状の緩和：  
関節痛・筋肉痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)
2. 脚気  
「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
3. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠 ○○○	2回
15歳未満の小児	✕服用しないこと	

●食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量(6錠中)

成分・分量	働き
ボウイ乾燥エキス 240.0mg (防已として 3000mg)	大葛藤(オオツヅラフジ)の茎及び根茎から抽出された成分で、痛みや炎症を抑える作用があり、関節痛・神経痛などを緩和します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 900.0mg	関節軟骨の構成成分のひとつです。
ベンフォチアミン 13.83mg 〔チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)として 10.0mg〕	からだに取り込まれやすくなった活性ビタミンB1で、関節痛・神経痛などを緩和します。
メコバラミン(V.B12) 60.0μg	キズついた末梢神経に働きかけます。
ガンマ-オリザノール 10.0mg	神経を調整し、関節痛を緩和します。

[添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して、外箱に入れて保管してください。(光によって品質に影響を与える場合があります。)
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- ⑤容器の中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- ⑥容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- ⑦外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。
- ⑧使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。



### 本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせ先は下記でございます。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어



<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>